

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوترا کاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ -

سوی سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوترا کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

**رشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ -

۱- ننانالی حداقل سطح پایایی را چقدر پیشنهاد می‌کند؟

۰/۷ . ۴      ۰/۵ . ۳      ۰/۴ . ۲      ۰/۲ . ۱

۲- کدام گزینه در رابطه با قواعد نام گذاری متغیرها صحیح می‌باشد؟

- ۲. باید با عدد شروع شود.
- ۴. باید شامل نماد باشد.
- ۱. باید فاصله داشته باشد.
- ۳. باید منحصر به فرد باشد.

۳- نتایج تحلیل‌های اجرایی از جمله جدول‌ها و نمودارها در کدامیک از پنجره‌های SPSS نشان داده می‌شود؟

Viewer . ۲	Data Editor . ۱
Pivot Table Editor . ۴	Chart Editor . ۲

۴- هنگام ذخیره بروندادهای حاصل از تحلیل‌های آماری، SPSS فایل را با چه دنباله یا پسوندی ذخیره می‌کند؟

.pdf . ۴      .doc . ۳      .sav . ۲      .spo . ۱

۵- برای حذف همه دستورهای قبلی از کادرهای گفتگوی SPSS کدام دکمه را کلیک می‌کنید؟

Help . ۴	Cancel . ۳	Reset . ۲	OK . ۱
----------	------------	-----------	--------

۶- زمانی که می‌خواهید اطلاعات متنی برای مثال نام و نام خانوادگی افراد را در خانه‌های SPSS وارد کنید، در این صورت شما باید نوع متغیر را در صفحه Variable view به ..... تغییر دهید.

Dot . ۴      Comma . ۳      String . ۲      Numeric . ۱

۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در SPSS مورد هایی را کنار می‌گذارد که داده‌های مورد نیاز برای تحلیل‌های خاص نداشته باشند؟

Exclude cases Pairwise . ۲      Exclude cases listwise . ۱

Replace with mean . ۴      Exclude cases backwise . ۲

۸- با کدامیک از آزمون‌های زیر می‌توان نرمال بودن توزیع نمره‌ها را سنجش کرد؟

۱. کروسکال والیس      ۲. ویلکاکسون      ۳. فریدمن      ۴. کلموگروف اسمیرنف

۹- برای نمایش توزیع داده‌های یک متغیر پیوسته (برای مثال سن یا نمره‌های استرس تصویری) کدامیک از نمودارهای زیر را مناسب می‌دانید؟

۱. میله‌ای      ۲. خطی      ۳. جعبه‌ای      ۴. ستونی

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتروکاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۶۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۲

- ۱۰- کدام یک از نمودارهای زیر را می‌توان برای شناسایی داده‌های پرت استفاده کرد؟
- |        |            |          |            |
|--------|------------|----------|------------|
| ۱. خطی | ۲. جعبه‌ای | ۳. ستونی | ۴. میله‌ای |
|--------|------------|----------|------------|
- ۱۱- برای محاسبه نمره کلی مقیاس‌ها از کدام گزینه در منوی Transform استفاده می‌کنید؟
- |                 |                   |            |           |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| Shift Values .۴ | Visual Binning .۳ | Compute .۲ | Recode .۱ |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|
- ۱۲- دامنه بھینه برای همبستگی بین سؤال‌ها به عنوان شاخص پایایی چقدر می‌باشد؟
- |               |               |                 |             |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| ۱. صفر تا ۰/۱ | ۲. ۰/۲ تا ۰/۴ | ۳. ۰/۲۵ تا ۰/۶۰ | ۴. ۰/۷ تا ۱ |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|
- ۱۳- برای بررسی شدت رابطه بین دو متغیر پیوسته از کدام آزمون آماری بهتر است استفاده شود؟
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ۱. ضریب همبستگی پیرسون | ۲. ضریب همبستگی اسپیرمن |
|------------------------|-------------------------|
- ۱۴- برای بررسی این سؤال که "آیا رابطه‌ای بین جنسیت و نرخ کناره‌گیری از درمان وجود دارد؟" کدام آزمون آماری را توصیه می‌کنید؟
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ۱. تحلیل واریانس | ۲. مجدور کای |
|------------------|--------------|
- ۱۵- هنگام اجرای مقایسه‌های تعقیبی، اگر سطح آلفا برابر ۰/۰۵ باشد و بخواهیم از تصحیح بن فرونی برای کنترل خطای نوع اول استفاده کنیم، برای سه مقایسه سطح آلفای جدید چقدر خواهد بود؟
- |          |         |         |          |
|----------|---------|---------|----------|
| ۱. ۰/۰۰۸ | ۲. ۰/۱۵ | ۳. ۰/۶۰ | ۴. ۰/۰۱۷ |
|----------|---------|---------|----------|
- ۱۶- با کدام یک از روش‌های همبستگی زیر می‌توان رابطه بین دو متغیر را در حالی که اثر یک متغیر دیگر را کنترل می‌کنید، بررسی کرد؟
- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| ۱. همبستگی تفکیکی | ۲. همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای |
|-------------------|-------------------------------|
- ۱۷- برای بررسی عدم تخطی از مفروضه‌های خطی و یکسانی پراکندگی در تحلیل همبستگی کدام یک از نمودارهای زیر را ترسیم می‌کنید؟
- |                 |                    |                   |                   |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ۱. نمودار ستونی | ۲. نمودار پراکندگی | ۳. نمودار جعبه‌ای | ۴. نمودار میله‌ای |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتروکاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۶۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۲

۱۸- بر اساس ملاک کوهن کدامیک از مقادیر زیر اندازه اثر متوسط را در تحلیل های همبستگی نشان می دهد؟

۰/۵۴ . ۴      ۰/۳۲ . ۳      ۰/۲۳ . ۲      ۰/۱۲ . ۱

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر در مورد معنی داری نتایج همبستگی درست است؟

۱. در نمونه های کوچک ( $N=30$ ) همبستگی های خیلی کوچک از نظر آماری معنی دار می شوند.

۲. در نمونه های کوچک ( $N=30$ ) ممکن است همبستگی های متوسط در سطح معمول  $P$  کوچک تر از  $0/05$  به لحاظ آماری معنی دار شوند.

۳. در نمونه های بزرگ ( $N=100$ ) همبستگی های خیلی کوچک از نظر آماری معنی دار می شوند.

۴. معنی داری آماری در همبستگی ارتباطی با تعداد نمونه ندارد.

۲۰- برای محاسبه همبستگی، کدامیک از گزینه های زیر را در منوی Analyze انتخاب می کنید؟

Compare Means . ۲      General Linear Model . ۱

Correlate . ۴      Crosstabs . ۲

۲۱- خطای نوع اول چه زمانی اتفاق می شود؟

۱. زمانی که گروه ها متفاوت باشد و ما نشان دهیم که هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود ندارد.

۲. زمانی که نشان دهیم گروه ها تفاوتی با هم ندارند در حالی که آنها متفاوتاند.

۳. زمانی که گروه ها متفاوتاند و ما تفاوت بین آنها را نشان دهیم.

۴. زمانی که گروه ها تفاوتی ندارند و نشان دهیم که تفاوت واقعی بین گروه ها وجود ندارند.

۲۲- معادل غیر پارامتریک آزمون تی نمونه های مستقل چیست؟

۱. یو من ویتنی      ۲. مجذور کای      ۳. ویلکاکسون      ۴. فریدمن

۲۳- کدامیک از سطوح معنی داری زیر برای آزمون لون نشان می دهد که واریانس های دو گروه یکسان نیست و شما از مفروضه یکسانی واریانس تخطی کرده اید؟

۱. سطح معنی داری بزرگ تر از  $0/05$

۲. سطح معنی داری بزرگ تر از  $0/10$

۲۴- زمانی که می خواهید میانگین نمره های گروه واحدی از افراد را در دو موقعیت مختلف مقایسه کنید یا زمانی که در دو نمونه زوج های همتا دارید، از کدام آزمون آماری استفاده می کنید؟

۱. تی مستقل      ۲. تی وابسته      ۳. مجذور کای      ۴. ضریب همبستگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتروکاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۶۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۲

-۲۵ برای مقایسه میانگین نمره‌های بیش از دو گروه بهتر است از کدام آزمون آماری استفاده کنیم؟

۴. یو من ویتنی

ANCOVA . ۳

ANOVA . ۲

۱. تی مستقل

-۲۶ کدام یک از آماره‌های زیر در موقع تخطی از مفروضه‌های همگنی واریانس‌ها در تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی ترجیح داده می‌شوند؟

Scheffe- Tukey . ۲

LSD- Duncan . ۱

Brown Forsythe- Welch . ۴

Bonferroni . ۲

-۲۷ برای محاسبه اندازه اثر نتایج تحلیل واریانس چه کار باید بکنیم؟

۱. مجموع مجذورات بین گروه‌ها را بر مجموع مجذورات درون گروه‌ها تقسیم می‌کنیم.

۲. مجموع مجذورات درون گروه‌ها را بر مجموع مجذورات بین گروه‌ها تقسیم می‌کنیم.

۳. مجموع مجذورات بین گروه‌ها را بر مجموع کل مجذورات تقسیم می‌کنیم.

۴. مجموع کل مجذورات را بر مجموع مجذورات بین گروه‌ها تقسیم می‌کنیم.

-۲۸ بر اساس ملاک کوهن کدام یک از مقادیر زیر اندازه اثر متوسط در نظر گرفته می‌شود؟

۰/۲۹ . ۴

۰/۱۴ . ۳

۰/۰۶ . ۲

۰/۰۱ . ۱

-۲۹ برای جدول‌های بزرگ‌تر از  $2 \times 2$  در مجذور کای کدام یک از ضرایب زیر برای اندازه اثر آن گزارش می‌شود؟

۴. ضریب مجدور اتا

۳. ضریب دی کوهن

۲. ضریب وی کرامر

۱. ضریب فی

-۳۰ برای اجرای آزمون مجذور کای برای استقلال کدام یک از گزینه‌های زیر را استفاده می‌کنید؟

Compare Means . ۲

Crosstabs . ۱

Explore . ۴

Frequencies . ۲

## وضعیت کلید پاسخ صحیح د ج ب الف شماره سوال

١	X	د	عادی
٢	X	ج	عادی
٣	X	ب	عادی
٤	X	الف	عادی
٥	X	ب	عادی
٦	X	ب	عادی
٧	X	ب	عادی
٨	X	د	عادی
٩	X	د	عادی
١٠	X	ب	عادی
١١	X	ب	عادی
١٢	X	ب	عادی
١٣	X	الف	عادی
١٤	X	ج	عادی
١٥	X	د	عادی
١٦	X	الف	عادی
١٧	X	ب	عادی
١٨	X	ج	عادی
١٩	X	ج	عادی
٢٠	X	د	عادی
٢١	X	الف	عادی
٢٢	X	الف	عادی
٢٣	X	ب	عادی
٢٤	X	ب	عادی
٢٥	X	ب	عادی
٢٦	X	د	عادی
٢٧	X	ج	عادی
٢٨	X	ب	عادی
٢٩	X	ب	عادی
٣٠	X	الف	عادی