

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

- چه کسی از تریاک برای درمان اسهال و رفع درد استفاده می کرد؟

۱. تئوفراست ۲. پاراسلوس ۳. توماس سیرنهام ۴. هومر

- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰ میلیون نفر ۲. ۹۰ میلیون نفر ۳. ۱۶۸ میلیون نفر

- خوردن تریاک در چه دوره ای در کشور مرسوم بوده است؟

۱. قاجاریه ۲. صفويه ۳. پهلوی ۴. زندیه

- در حدود چند درصد موارد همراه با اعتیاد، اختلالات دیگر روانپزشکی وجود دارد؟

۱. ۴۰ درصد ۲. ۶۰ درصد ۳. ۷۰ درصد ۴. ۵۰ درصد

- گروه همسالان در شروع مصرف کدام مواد بسیار موثر هستند؟

۱. الکل و سیگار ۲. حشیش و هروئین ۳. سیگار و حشیش ۴. سیگار و هروئین

- چه چیزی برای بدست آوردن بینش روانشناختی و ادراک خویشتن نقش تعیین کننده دارد؟

۱. توانایی کنترل توجه، تمرکز و تفکر ۲. توانایی کنترل عوامل مخاطره آمیز اجتماعی

۳. دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای ۴. توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه

- کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب در طبقه بندی مواد محرک زا و مواد افیونی می باشند؟

۱. کوکائین - کدئین ۲. متادون - حشیش ۳. والیوم - نیکوتین ۴. هروئین - کافئین

- کدامیک از انواع داروهای مخدر را گاهی در آب حل کرده و بصورت شربت بنفس رنگی مصرف می کنند؟

۱. هروئین ۲. حشیش ۳. مورفین ۴. سوخته تریاک

- قبل از اواسط دهه ۸۰ شایعترین شکل مصرف کوکائین کدام روش بوده است؟

۱. ترریق ۲. انفیه ۳. خوراکی ۴. تدخین

- کدامیک از موارد زیر در پزشکی بعنوان دارویی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. متامفتامین ۲. فن سیکلیدین ۳. باربیتورات ها ۴. آرام بخش خفیف

سری سوال: ۱_یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام گزینه از آثار مصرف بالای کوکائین می باشد؟

- ۱. گیجی، رخوت و خواب آلودگی
- ۲. اختلال در کار دستگاه لیمبیک
- ۳. قرمز شدن چشم ها
- ۴. تغییر رفتار جنسی

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تاثیر بر نظام کدام انتقال دهنده عصبی است؟

- ۱. دوپامین
- ۲. اپی نفرین
- ۳. سروتونین
- ۴. نوراپی نفرین

۱۳- علائم ترک مواد افیونی تا چند روز بعد از ترک فروکش می کند؟

- ۱. ۳_۲ روز
- ۲. ۱۵_۱۲ روز
- ۳. ۱۱_۷ روز
- ۴. ۵_۷ روز

۱۴- از مهمترین روانشناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، کیست؟

- ۱. کاتالوند
- ۲. مارلات
- ۳. هانت
- ۴. میلر

۱۵- چه کسی می فرماید که خداوند ترک می خوارگی را واجب نمود تا عقل فرد بر جای بماند؟

- ۱. امام صادق (ع)
- ۲. امام هادی (ع)
- ۳. پیامبر اکرم (ص)
- ۴. امام علی (ع)

۱۶- از دیدگاه صاحب نظران بیشترین عود ها در فاصله چند ماه بعد از اتمام درمان اتفاق می افتد؟

- ۱. ۳ ماه
- ۲. ۵ ماه
- ۳. ۴ ماه
- ۴. ۲ ماه

۱۷- ابداع و اجرای برنامه اجتماع درمان مدار TC در کدام کشور راه اندازی شد؟

- ۱. مجارستان
- ۲. آلمان
- ۳. انگلستان
- ۴. اتریش

۱۸- اولین مرحله از مراحل یک دوره ای اجتماع درمان مدار کدام مرحله است؟

- ۱. مرحله جهت یابی
- ۲. مرحله درمان
- ۳. مرحله پیش از ورود مجدد
- ۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۹- کدام یک از مراحل درونی سازی، نمایانگر حداکثر پیوندجویی فرد با برنامه بوده است؟

- ۱. تعهد
- ۲. همنوایی
- ۳. همکاری
- ۴. یگانگی

۲۰- عناصر اولیه تمام اختلالات شخصیت چیست؟

- ۱. حالت و افکار
- ۲. ادراک و هیجان
- ۳. مزاج و هیجان
- ۴. مزاج و منش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحصیلی / کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

- ۲۱- چه کسی در تئوری خود معتقد است که مصرف مواد ممکن است با سیستم هایی از مغز در ارتباط باشد که به طوری درگیر محرك های جدید تنفرآمیز و اشتیاق آور هستند؟

۴. برنز

۳. مارتینز

۲. میلون

۱. کلونینکر

- ۲۲- کدام دسته از روان شناسان به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته است؟

۲. روان شناسان اصالت وجود

۱. روان شناسان گشتالتی

۴. روان شناسان درمانی مبتنی بر اجتماع

۳. روان شناسان یادگیری

- ۲۳- سومین عامل رفتار فرد در نظریه رفتار طرح ریزی شده، در دیدگاه راتر چیست که از اهمیت بسزایی برخوردار است؟

۲. خودکارآمدی

۱. منبع کنترل

۴. هنجارها و نگرش ها

۳. کنترل رفتار ادراک شده

- ۲۴- کدام یک از فضاهای زیر موجب می شود که معتادان قادر نباشند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند؟

۴. منطبق

۳. میدان دهن

۲. هم وابستگی

۱. گله مند

- ۲۵- کدام یک از انواع نظریات زیر عمدتاً بر عوامل اجتماعی و بین فردی تکیه می کنند؟

۲. نظریه های یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد

۱. نظریه های تعهد به رسوم و قواعد و تعلق اجتماعی

۴. نظریه عمل متکی بر استدلال

۳. نظریه های شناختی_ عاطفی

- ۲۶- در روند همه گیر شدن ایدز عمدت ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در امریکا کدام گروه هستند؟

۲. شرکای جنسی تزریق کننده

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر

۴. مردانی که با دیگر مردان رابطه جنسی دارند.

۳. افرادی که تزریق خونی می کنند.

- ۲۷- بیشترین علت موارد انتقال بیماری های هپاتیت در بزرگسالان ، کدام روش است؟

۴. آمیزش جنسی

۳. تنفس در هوای آلوده

۲. تماس با میکروب

۱. از راه خون

- ۲۸- کدام بیماری در قرن حاضر به عنوان بیماری باز پدید نامیده می شود؟

۴. سیفلیس

۳. سل

۲. هپاتیت

۱. ایدز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

و شهه تحصیلی / کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

- ۲۹- کدام یک از انواع برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخاسته است؟

۱. برنامه های عاطفی - بین فردی
۲. برنامه آموزشی شناختی
۳. برنامه های جایگزین
۴. برنامه های رفتاری با رویکرد اثرهای اجتماعی

- ۳۰- آموزش برنامه های رفتاری چه هنگامی موثرند؟

۱. هنگامی که هر دو شیوه برنامه رفتاری در آن با یکدیگر ترکیب شوند.
۲. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد اثرهای اجتماعی باشد.
۳. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد آموزش مهارت‌های فردی - اجتماعی باشد.
۴. هنگامی که شیوه های برنامه های رفتاری با برنامه های آموزشی توأم شود.

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعية كليد
١	الف	عادي
٢	ب	عادي
٣	ب	عادي
٤	ج	عادي
٥	ج	عادي
٦	د	عادي
٧	الف	عادي
٨	د	عادي
٩	ب	عادي
١٠	الف	عادي
١١	د	عادي
١٢	ج	عادي
١٣	ج	عادي
١٤	ب	عادي
١٥	د	عادي
١٦	الف	عادي
١٧	ج	عادي
١٨	الف	عادي
١٩	ب	عادي
٢٠	د	عادي
٢١	الف	عادي
٢٢	ب	عادي
٢٣	الف	عادي
٢٤	ج	عادي
٢٥	ب	عادي
٢٦	د	عادي
٢٧	د	عادي
٢٨	ج	عادي
٢٩	الف	عادي
٣٠	الف	عادي