

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. آلفرد بینه ۲. استانلی هال ۳. بنیامین راش ۴. ویتمر

۲- در کدامیک از دیدگاه های زیر، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله فرایند رفتار ۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری به منزله سلامت ۴. بهنجاری به منزله سازش با توقعات خود و جهان بیرون

۳- در کدامیک از رویکردهای زیر، مفاهیمی همچون اضطراب، ناخودآگاه، مکانیزم های دفاعی روانی و مراحل رشد روانی جنسی از مفاهیم کلیدی محسوب می شود؟

۱. الگوی روان پویایی ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی زیست شناختی

۴- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۱. مشاهده رفتارهای فرد ۲. پیش آگهی و تعیین یک برنامه درمانی
۳. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی ۴. تداخل در فعالیت فردی و اجتماعی

۵- کدام گزینه از ابزارهای نسبتاً گویا و فراگیر است که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوان دارد؟

۱. آزمون هوش ریون ۲. آزمون روانی شناختی وکسلر

۳. آزمون هوش آلفرد بینه ۴. آزمون پیشرفت تحصیلی

۶- کدامیک از اصل های زیر را می توان به سه درجه اتفاقی، گذرا و پایدار تقسیم بندی نمود؟

۱. اصل شایستگی سنی ۲. اصل فراوانی یک رفتار ۳. اصل شدت یک رفتار ۴. اصل تداعی یک رفتار

۷- بر اساس نظریه پیاز، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می برند؟

۱. کودکی دوم ۲. دوران شیرخوارگی و کودکی اول
۳. دوران بلوغ ۴. کودکی سوم

۸- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلال رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۱. نشستن ۲. خزیدن ۳. تکلم ۴. راه رفتن

۹- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی می باشد؟

۱. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری ۲. کاردرمانی به همراه آموزش اجتماعی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی ۴. گروه درمانی و آموزش های مهارتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام گزینه از علل زمینه ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می شوند؟

۱. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالیدگی مغز
۲. فشار زبان و مشکلات کاربردی آن
۳. صدمات ارگانیکی و ساختاری
۴. آپراکسی گفتار

۱۱- کدام گزینه از ویژگی های اوتیسم می باشد؟

۱. این اشکال پس از یک دوره رشد عادی و در نتیجه یک بیماری عصبی یا جسمانی رخ می دهد
۲. این کودکان در تعامل اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازیهای سمبلیک و خلاق مشکل دارند
۳. کودکان دارای اختلال دیرتر از همسالانشان زبان باز می کنند
۴. مهمترین ویژگی بالینی در این افراد اشکال اساسی در درک و در بیان زبان است

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد حدود چند درصد می باشد؟

۱. 1٪
۲. 2.5٪
۳. 10٪
۴. 5٪

۱۳- کدام گزینه از جمله اختلالات تغذیه و خوردن است که در دوره رشد آغاز می شود؟

۱. نشخوارگری
۲. بی اشتهاپی روانی
۳. پرخوری
۴. اختلال خوردن نامعین

۱۴- اختلال هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. 48_24 ماهگی
۲. 24_12 ماهگی
۳. 36_12 ماهگی
۴. 36_18 ماهگی

۱۵- کدام روش درمانی بعنوان موثرترین روش درمانی در موقع پرخوری شناخته می شود؟

۱. درمانهای روانشناختی
۲. درمانهای دارویی
۳. روان درمانی پویشی
۴. خانواده درمانی

۱۶- در کدامیک از انواع نارسایی های یادگیری مبتلایان به آن از نظر بهره هوشی، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. خوانش پریشی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی ویژه ریاضی
۴. نارسایی های ارتباطی

۱۷- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. 8_6 سالگی
۲. 7_2 سالگی
۳. 5_3 سالگی
۴. 10_8 سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۸- پژوهش های پس از مرگ بر روی مغز مبتلایان به دیسلکسی، ناهنجاری در کدام ناحیه از مغز را نشان می دهد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ
۲. لوب گیجگاهی فوقانی
۳. لوب گیجگاهی میانی
۴. بخش آهیانه ای - گیجگاهی

۱۹- برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار، دفع ادرار باید به چه صورت اتفاق بیفتد؟

۱. حداقل یکبار در هفته به مدت دو ماه
۲. حداقل سه بار در هفته به مدت لااقل یک ماه
۳. حداقل دوبار در هفته به مدت دو ماه
۴. حداقل دوبار در هفته به مدت لااقل سه ماه

۲۰- گزینه صحیح را مشخص کنید؟

۱. بی اختیاری مدفوع اولیه زمانی رخ می دهد که کودک حداقل شش ماه توانسته باشد مدفوعش را کنترل کند
۲. بی اختیاری ادراری ثانویه عمدتاً با تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد همراه است
۳. حدود نیمی از کسانی که دچار بی اختیاری مدفوع هستند، بی اختیاری ادرار را نیز نشان می دهند
۴. بر اساس مطالعات همه گیر شناسی مشخص شده که در سن ۵ سالگی شیوع بی اختیاری ادراری در پسران دو برابر نسبت آن به دخترهاست

۲۱- مهم ترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری کدام است؟

۱. استفاده از رفتاردرمانی با تاکید بر شرطی سازی کلاسیک
۲. مداخله های آموزشی و تربیتی
۳. دارودرمانی با استفاده از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
۴. درمان شناختی- رفتاری مرتبط

۲۲- نخستین روان پزشکی که در سال ۱۸۶۷ به طور جدی به کودکان خردسالی که مبتلا به اختلال شدید روانی همراه با انحراف، تاخیر و دگرگونی بارز در فرایندهای رشد بودند، توجه نمود چه کسی بود؟

۱. هانس آسپرگر
۲. هنری موزلی
۳. لئوکانر
۴. راتر

۲۳- شیوع کدام رفتار در کودکان درخودمانده در اوقاتی که آنها در سکان های سازمان نیافته تنها هستند، بیشتر است؟

۱. رفتار خودجرحی
۲. رفتار خودتحریکی
۳. رفتار اجتماعی
۴. رفتار تشریفاتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ :تستی :تشریحی: ۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ :تشریحی: ۰۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۴- رویکردهای مداخله جویانه ای چون مدل سازی، تقویت، مدیریت خود و آموزش مستقیم مربوط به کدام یک از روش های درمان رفتاری- آموزشی می باشد؟

۱. درمان پاسخ محوری
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. تحلیل رفتار کاربردی

۲۵- کدام یک از داروهای زیر سطح سروتونین خون را کاهش داده و در برخی از کودکان درخودمانده موثر است؟

۱. فن سیکلیدین
۲. هالوپریدول
۳. فن فلورامین
۴. ریتالین

۲۶- شیوع کدام اختلال تنها در دختران تشخیص داده شده است؟

۱. اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی
۲. اختلال آسپرگر
۳. درخودماندگی
۴. اختلال رت

۲۷- حداقل سن شروع اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی چند سالگی است؟

۱. ۲ سالگی
۲. ۴ سالگی
۳. ۳ سالگی
۴. ۵ سالگی

۲۸- کدام اختلال از جمله رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان می باشد؟

۱. اختلال فراگیر مربوط به رشد
۲. نارسایی ذهنی
۳. نارسایی های یادگیری
۴. اختلال کمبود توجه

۲۹- معمولاً نخستین علامتی که در افراد مبتلا به ADHD فروکش نمی کند، کدام است؟

۱. پرتحرکی
۲. حواس پرتی
۳. مشکلات یادگیری
۴. اختلالات خلقی

۳۰- کدامیک از انواع درمانهای زیر مربوط به اختلال سلوک می باشد؟

۱. بازی درمانی
۲. درمان چندالگویی
۳. روان درمانی انفرادی
۴. درمان تغذیه ای

1217243 - 98-99-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
۱	د	عادي
۲	الف	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	ب	عادي
۶	د	عادي
۷	ب	عادي
۸	ج	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ج	عادي