

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی ۲. عاداتی- خلقی ۳. خلقی- اضطرابی ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مشاهده ۲. نقاشی ۳. مصاحبه ۴. بازی

۳- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک ۲. تشخیص ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۴- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر ۲. دشوار و پیچیده تر ۳. مهمتر و حساس تر ۴. اولویت دار تر و سخت تر

۵- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی ۲. روان آزمایی ۳. شرح حال ۴. بازی و نقاشی

۶- در سال اول زندگی کودک رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی ۲. عصبی ۳. شناختی ۴. عاطفی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 10 درصد ۲. 5 درصد ۳. 12 درصد ۴. 15 درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی ۲. دریافتی- بیانی ۳. ارتباطی نامشخص ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ، ویژگی اصلی کدام اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی ۲. ارتباطی نامشخص ۳. دریافتی- بیانی ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزو مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی ۲. لکنت زبان ۳. ارتباطی نامشخص ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولا نابهنجار تلقی می شود؟

۱. 18 ماهگی ۲. 20 ماهگی ۳. 12 ماهگی ۴. 24 ماهگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. خواب آور ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی ۲. روان درمانی حمایتی ۳. خانواده درمانی ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه ۲. نوشتن ۳. شنیدن ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. کلینیک ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن ۲. ریاضی ۳. نوشتن ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. 1 تا 3 سالگی ۲. 2 تا 3 سالگی ۳. 3 تا 5 سالگی ۴. 2 تا 4 سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. اختلال ارتباط بیانی
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. درماندگی آموخته شده

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی - آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین مشکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تفکر را چه می نامند؟

۱. کم توجهی
۲. نوروزگرایی
۳. تکانشگری
۴. کم فعالی

۲۸- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۶ سالگی
۳. ۴ سالگی
۴. ۷ سالگی

1217243 - 97-98-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	ب	عادي
۵	ب	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	د	عادي