

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی      ۲. عاداتی- خلقی      ۳. خلقی- اضطرابی      ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مصاحبه      ۲. مشاهده      ۳. نقاشی      ۴. بازی

۳- در سال اول زندگی کودک، رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی      ۲. عصبی      ۳. شناختی      ۴. عاطفی

۴- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک      ۲. تشخیص      ۳. رابطه      ۴. وضعیت روانی

۵- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر      ۲. دشوار و پیچیده تر      ۳. مهمتر و حساس تر      ۴. اولویت دارتر و سخت تر

۶- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی      ۲. روان آزمایی      ۳. شرح حال      ۴. بازی و نقاشی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۱۰ درصد      ۲. ۵ درصد      ۳. ۱۲ درصد      ۴. ۱۵ درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی      ۲. دریافتی- بیانی      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ ویژگی اصلی چه اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی      ۲. ارتباطی نامشخص      ۳. دریافتی- بیانی      ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزء مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی      ۲. لکنت زبان      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی      ۲. ۲۰ ماهگی      ۳. ۱۲ ماهگی      ۴. ۲۴ ماهگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری      ۲. نشخوار      ۳. بی اشتهایی      ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری      ۲. هرزه خواری      ۳. بی اشتهایی روانی      ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب      ۲. ضد افسردگی      ۳. خواب آور      ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی      ۲. روان درمانی حمایتی  
۳. خانواده درمانی      ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه      ۲. نوشتن      ۳. شنیدن      ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده      ۲. مدرسه      ۳. کلینیک      ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن      ۲. ریاضی      ۳. نوشتن      ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. 1 تا 3 سالگی      ۲. 2 تا 3 سالگی      ۳. 3 تا 5 سالگی      ۴. 2 تا 4 سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه  
۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه  
۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. درماندگی آموخته شده
۳. اختلال ارتباط بیانی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتها بی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی- آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین شکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تکرار را چه می نامند؟

۱. تکانشگری
۲. کم فعالی
۳. کم توجهی
۴. نوروز گرایی

۲۸- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۷ سالگی
۳. ۶ سالگی
۴. ۴ سالگی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتها بی روانی

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	الف	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	ب	عادي
۶	ب	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي